



ТЕКРО
більше ніж годівля!



АНТИБІОТИКИ



Медітек DOX 500

Порошок для перорального застосування



Склад: 1 кг препарату містить діючу речовину: доксицикліну гіклат - 500 г.

Фармакологічні властивості

ATC vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01AA02 – Доксициклін.

Доксициклін - бактеріостатичний антибіотик, що належить до групи тетрациклінів. Механізм дії пов'язаний з пригніченням синтезу мікробного білка.

Доксициклін діє проти грам позитивних (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Bacillus anthracis*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium* spp., *Actinomyces* spp.) та грамнегативних бактерій (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Shigella* spp., *Yersinia* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Leptospira* spp., *Campylobacter* spp., *Bacteroides* spp., *Fusobacterium* spp., *Acinetobacter* spp., *Treponema* spp., *Lawsonia intracellularis*, *Vibrio* spp., *Neisseria* spp., *Brucella* spp.), а також мікоплазм (*Mycoplasma* spp.), рикетсій (*Rickettsia* spp.) та хламідій (*Chlamydia* spp.).

Препарат має високу біодоступність. Після перорального застосування у більшості видів тварин досягались рівні біодоступності, вищі за 70%. Завдяки ліпофільним властивостям, доксициклін легко проникає в тканини тварини. Метаболізм у печінці досить незначний. Виведення препарату відбувається через слизову оболонку кишкового тракту і, меншою мірою, препарат екскретується з жовчю.

Застосування

Лікування свиней та курей-бройлерів при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до доксицикліну.

Дозування

Перорально з питною водою у дозах.

Свині: 200 г препарату на 1000 л питної води (10 мг доксицикліну на 1кг маси тіла) щодобово протягом 3-5 діб. Таке дозування та тривалість застосування підходить для всіх вікових категорій свиней.

Кури-бройлери: 200 г препарату на 1000 л питної води (10 мг доксицикліну на 1кг маси тіла) щодобово протягом 3-5 діб. Таке дозування та тривалість застосування підходить для всіх вікових категорій бройлерів.

Готовий розчин з препаратом необхідно використати протягом 6 годин!
За 2 години перед застосуванням препарату слід обмежити подачу води.

Період виведення (каренції)

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 5 діб після останнього застосування препарату.

Протипоказання

Підвищена чутливість до препаратів групи тетрациклінів.

Не застосовувати тваринам при важких порушеннях функції печінки та нирок.

Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи пеніцилінів, цефалоспоринів, хінолонами та циклосерином.


Не застосовувати одночасно з препаратами, що містять у своєму складі катіони Mg^{2+} , Al^{3+} , Ca^{2+} , оскільки останні зв'язуються з доксицикліном та перешкоджають його абсорбції.

Не застосовувати свиноматкам під час вагітності та лактації.

Медітек

АМОКС

порошок для перорального застосування



Склад: 1 г препарату містить діючі речовини: амоксициліну тригідрат - 500 мг.

Фармакологічні властивості

ATC vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01CA04 – Амоксицилін.

Амоксицилін – це бета-лактамний антибіотик з широким спектром дії, який належить до групи амінопеніцилінів. Він перешкоджає синтезу бактеріальної клітинної стінки шляхом інгібування ензимів транспептидази та карбоксипептидази, що викликає осмотичний дисбаланс та загибель бактерії у фазі росту.

Амоксицилін діє проти грамнегативних (*Actinobacillus* spp., *Escherichia coli*, *Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Moraxella* spp., *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp.) та грампозитивних (*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *A. suis*, *A. equuli*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.) мікроорганізмів, а також проти *Leptospira* spp.

Біодоступність амоксициліну становить 65-93 %.

Застосування

Лікування **свиней** та **курей-бройлерів** при захворюваннях травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри та м'яких тканин, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.

Дозування

Перорально з питною водою у дозах.

Свині – 200-500 г препарату на 1000 л питної води (10-25 мг амоксициліну тригідрату на 1 кг маси тіла) щодобово протягом 3-5 діб. Таке дозування та тривалість застосування підходить для всіх вікових категорій свиней.

Кури-бройлери – 200-400 г препарату на 1000 л питної води (10-20 мг амоксициліну тригідрату на 1 кг маси тіла) щодобово протягом 3-5 діб;

Таке дозування та тривалість застосування підходить для всіх вікових категорій курей-бройлерів.

Рекомендовану дозу препарату необхідно ділити на два прийоми з інтервалом 12 годин.

Готовий розчин з препаратом необхідно використати протягом 24 годин! За 2 години перед застосуванням препарату слід обмежити подачу води.

Період виведення (каренції)

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 2 доби після останнього застосування препарату.

Протипоказання

Підвищена чутливість до пеніцилінів та інших бета-лактамів.

Препарат не застосовувати кролям, мурчакам, хом'якам чи іншим дрібним травоядним тваринам.

Не застосовувати тваринам із тяжкими порушеннями нирок.

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначені для використання в їжу людям.

Не застосовувати одночасно з макролідами, хлорамфеніколом та тетрациклінами.

Медітек

СТС 150

Порошок для перорального застосування



Склад: 1 кг препарату містить діючу речовину: хлортетрацикліну гідрохлорид - 150 г.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01AA03 – Хлортетрациклін.

Хлортетрациклін володіє хорошою бактеріостатичною дією, що пов'язана з пригніченням білкового синтезу в результаті взаємодії з 30s-субодинами рибосом бактерій. Хлортетрацикліни пригнічують ферменти, які беруть участь в процесі зв'язування транспортної РНК з акцепторами рибосом. Будучи інгібіторами біосинтезу білка, вони впливають на рибосоми клітин.

Хлортетрацикліни пригнічують ріст і розвиток грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (*Campylobacter* spp., *Leptospira* spp., *Brucella* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Moraxella bovis*, *Chlamydia* spp., *Coxiella* spp., *Rickettsia* spp., *Salmonella* spp., *E. coli*, *L. monocytogenes*, *Arcanobacterium pyogenes*).

Вони мало активні або зовсім не активні щодо протею, синьогнійної палички, більшості грибків і вірусів, слабо діють на кислотостійкі бактерії.

Застосування

Свині: лікування тварин, хворих на септицемію, гастрит, ентерит, бронхіт, пневмонію, плевропневмонію, перитоніт, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до хлортетрацикліну.

Кури-бройлери: лікування птиці, хворої на пастерельоз, сальмонельоз та інші захворювання, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до хлортетрацикліну.

Дозування

Перорально з кормом у дозах.

Свині: 3-4,5 кг препарату на 1 т комбікорму, що відповідає 20-35 мг хлортетрацикліну на 1 кг маси тіла. Необхідно брати до уваги денний прийом корму та масу тіла тварин. Курс лікування - 5-7 діб. Таке дозування та тривалість застосування підходить для всіх вікових категорій свиней.

Кури-бройлери: 3-4,5 кг препарату на 1 т комбікорму, що відповідає 20-35 мг хлортетрацикліну на 1 кг маси тіла. Курс лікування становить - 5-7 діб. Таке дозування та тривалість застосування підходить для всіх вікових категорій бройлерів.

Період виведення (каренції)

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 11 діб (свині) та 4 доби (кури-бройлери) після останнього застосування препарату.

Протипоказання

Підвищена чутливість до хлортетрацикліну.

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують для споживання людьми, а також жуйним тваринам з функціонально розвиненими передшлунками.

Не застосовувати одночасно з бета-лактамами антибіотиками, цефалоспоринами та аміноглікозидами.

Не застосовувати при важких хворобах печінки та нирок.

Медітек ТРИСУЛЬФА

Порошок для перорального застосування



Склад: 1 г препарату містить діючі речовини: триметоприм - 40 мг, сульфаметоксазол – 200 мг.

Фармакологічні властивості

ATC vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01EW11 – Сульфаметоксазол і триметоприм.

МЕДІТЕК ТРИСУЛЬФА - комбінований хіміотерапевтичний препарат, діючими речовинами якого є сульфаметоксазол та триметоприм.

Сульфаметоксазол (сульфаніламід) є бактеріостатичним препаратом, який втручається у синтез фолієвої кислоти в бактеріальних клітинах. Сульфаметоксазол володіє бактеріостатичною дією проти грампозитивних (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp.) та грамнегативних (*Klebsiella* spp., *Shigella* spp., *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Bordetella* spp., *Haemophilus* spp., *Proteus* spp.) мікроорганізмів.

Триметоприм є інгібітором дигідрофолатредуктази. Триметоприм володіє широким спектром дії проти грампозитивних (*Actinomyces* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.) та грамнегативних (*Bordetella* spp., *Brucella* spp., *E. coli*, *Haemophilus* spp., *Klebsiella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp.) мікроорганізмів.

Сульфаметоксазол з триметопримом швидко та повністю всмоктується з травного каналу при пероральному застосуванні, добре розподіляється по організму, проникає через плаценту. Максимальна концентрація діючих речовин у сироватці крові досягається приблизно за 2 години після перорального застосування препарату.

Сульфаметоксазол виводиться через нирки шляхом клубочкової фільтрації та канальцевої секреції. Невелика кількість виводиться з жовчю у незміненому вигляді. Триметоприм метаболізується у печінці, виводиться через нирки шляхом клубочкової фільтрації та канальцевої секреції.

Застосування

Лікування **свиней** та **курей-бройлерів** при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до сульфаметоксазолу та триметоприму.

Дозування

Перорально з кормом у дозах.

Свині, кури-бройлери: 1-3 кг препарату на 1 тонну комбікорму (10 мг сульфаметоксазолу + 2 мг триметоприму на 1 кг маси тіла – 25 мг сульфаметоксазолу+5 мг триметоприму на 1 кг маси тіла) щодобово протягом 7 діб.

При лікуванні актинобацильозу, пастерельозу, та захворювань, що спричинені *E. coli*, рекомендовано задавати найвищу дозу препарату.

Період виведення (каренції)

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 7 діб (свині) та 4 доби (кури-бройлери) після останнього застосування препарату.

Протипоказання

Підвищена чутливість до триметоприму та сульфаметоксазолу.

Не призначати тваринам з порушенням функції нирок та печінки.

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких використовують в їжу людям.

Не застосовувати одночасно з параамінобензойною кислотою та її сполуками, також із знеболювальними прокаїнового типу, а також з уротропіном (метенамін).

**ТЕКРО Україна - один із підрозділів чеської міжнародної корпорації
ТЕКРО, заснованої в 1991 році.**

5 причин працювати з ТЕКРО

1

Якість перевірена часом

- Сертифікація ISO 9001, ISO 14001, HACCP та знак Європейської якості.
- Власні сертифіковані лабораторні бази для контролю вхідної сировини та готової продукції.

2

Сучасні технології виробництва

- До проектування та будівництва заводів були залучені найкращі європейські фахівці, для забезпечення контролю якості на всіх етапах виробництва.

3

Висококваліфікований персонал

- Фахівці: ветеринарні лікарі, зоотехніки, науковці, кандидати ветеринарних та сільськогосподарських наук у сфері годівлі та утриманні тварин, вихідці з чеського Інституту преміксів і кормових добавок.

4

Власники промислового виробництва

- Свинокомплекс на 5000 свиноматок.
- Птахокомплекси більш ніж на 1 млн. голів: бройлерів, курей-несучок та індиків.
- Інкубатор на 35 млн. бройлерів.
- Молочна ферма з дійними коровами на 2500 голів.
- Окрім тваринництва компанія займається рослинництвом на площі 12000 га.

5

Більше 20 років досвіду на ринку

- Всі продукти, нові рецептури та технології перевіряються безпосередньо на тваринницьких та птахо комплексах і клієнт гарантовано отримує перевірені на якість та ефективність рішення.



Замовити товар: 0 800 503 112*

*дзвінки з усіх операторів безкоштовні в межах України

e-mail: order@tekro.ua

YouTube: [TEKRO](https://www.youtube.com/TEKRO)

**блоги: pig.tekro.ua,
poultry.tekro.ua**

www.tekro.ua

ТЕКРО – більше ніж годівля!